

GRUNNENDURLÍFGUN (BLS) SKREF FYRIR SKREF

Endurlifgunarráð
Icelandic Resuscitation Council IceRC




RÖÐ/AÐGERÐIR	LÝSING
ÖRYGGI 	<ul style="list-style-type: none"> Tryggja að þú, einstaklingurinn og aðrir björgunaraðilar séu öruggir
VIÐBRÖGÐ leita eftir viðbrögðum 	<ul style="list-style-type: none"> Hrista öxl einstaklinginn varlega og kalla hátt: "Er í lagi með þig"
ÖNDUNARVEGUR Opna öndunarveg 	<ul style="list-style-type: none"> Ef engin viðbrögð, setja einstaklinginn yfir á bakið Opna öndunarveginn með því að færa höfuð einstaklingsins varlega aftur á bak, með hendi á enni og fingur undir höku
ÖNDUN Horfa, hlusta, finna fyrir öndun 	<ul style="list-style-type: none"> Horfa, hlusta, finna fyrir öndun í ekki meira en 10 sekúndur Einstaklingur sem varla andar, andar óreglulega, hægt eða tekur stök, hávær andvörp, er ekki að anda édlilega
ENGIN EÐA ÓÐLILEG ÖNDUN Gera neyðarlínu/bráðateymi viðvart 	<ul style="list-style-type: none"> Ef engin eða óeðileg öndun, fáðu aðstoð til að hringja í neyðarlínu eða hringdu sjálf/ur Ekki yfirgefa einstaklinginn Virkja hótalaraviðmót símans eða handfrjálsan búað símans svo að þú getir hafið hnoð á meðan talað er við neyðarlínu
SENDA EFTIR HJARTASTUÐTÆKI (AED) Senda einhvern til að ná í hjartastuðtæki 	<ul style="list-style-type: none"> Senda einhvern til að finna og koma með hjartastuðtæki ef fáanlegt Ef þú ert ein/n, EKKI fara frá einstaklingnum, heldur byrjaðu hjartahnoð
BLÓÐRÁS Hefja hjartahnoð 	<ul style="list-style-type: none"> Krjúptu við hlið einstaklingsins Settu þykkhönd annrarar handar á miðjan brjóstkassa einstaklingsins - neðri helming bringubeins Settu þykkhönd á hinni hendinni ofaná handarbak og kræktu fingrum saman Haltu handleggjum beinum Staðsettu þig lóðrétt fyrir ofan brjóstkassa einstaklingsins og þrýstu beint niður á bringubeini niður amk 5 cm (en ekki meira en 6 cm) Eftir hvert hnoð, leyfðu brjóstkassa að rétta alveg úr sér án þess að lyfta höndum af bringubeini Endurtaktu hnoð á hraðanum 100-120 sinnum á hverri mínútu

GRUNNENDURLÍFGUN (BLS) SKREF FYRIR SKREF

Endurlífgunarráð
Icelandic Resuscitation Council IceRC


EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL
GUIDELINES
2021

RÖÐ/AÐGERÐIR	LÝSING
BLANDA BJÖRGUNARBLÁSTRUM MEÐ HJARTAHNOÐI 	<ul style="list-style-type: none">Ef þú hefur þjálfun til: Opna aftur öndunarveg eftir 30 hnoð með því að færa höfuð aftur.Nota þumal og vísifingur handarinnar sem er á enni einstaklingsins til að klemma saman mjúka hluta nefsinsLeyfa munni einstaklingsins að opnast með því að halda höfði afturTaktu eðlilegan andardrátt og settu varir þínar þétt yfir munn einstaklingsinsBlása rólega munn við munn í um það bil 1 sekúndu eins og við eðlilegan andardrátt og horfa um leið á hvort brjóstkassi lyftist. Þetta er árangursríkur björgunarblásturHalda höfði áfram í sömu stöðu, losa munn við munn tak og horfa eftir því hvort slakni á brjóstkassa eins og við eðlilega útöndunDraga aftur að sér loft eins og við eðilega innöndun, setja munn við munn og blása aftur til að klára alls tvo björgunarblástraEKKI trufla hnoð í meira en tíu sekúndur til að veita tvo björgunarblástra, jafnvel þó annar eða hvorugur hafi borið árangur.Staðsetja hendur án tafar aftur í hnoðstöðu á brjóstkassa og hnoða 30 sinnumHalda áfram hnoði og blæstri í hlutfallinu 30:2
ENDURLÍFGUN AÐEINS MEÐ HNOÐI 	<ul style="list-style-type: none">Ef þjálfun til að beita munn við munn aðferð er ekki til staðar, eða ekki möguleg, skal beita endurlífgun aðeins með hnoði (halda áfram stöðugu hnoði á hraðanum $100-120 \text{ min}^{-1}$)
ÞEGAR HJARTASTUÐTÆKI KEMUR kveikja strax á tækinu og líma rafskaut á brjóstkassa 	<ul style="list-style-type: none">Um leið og hjartastuðtæki kemur, kveikja á því og líma rafskaut á beran brjóstkassa einstaklingsinsEf fleiri en einn aðstoðarmaður, skal halda áfram endurlífgun á meðan rafskaut eru límd á brjóstkassa einstaklingsins
FYLGJA LEIÐBEINANDI RÖDD TÆKIS/ LEIÐBEINANDI MYNDUM 	<ul style="list-style-type: none">Fylgja leiðbeinandi rödd og myndum sem hjartastuðtæki gefurEf stuð er ráðlagt, tryggja að hvorki þú né aðrir snerti einstaklinginnÝta á stuðtakka eftir skipunHalda síðan strax áfram endurlífgun og fylgja leiðbeiningum úr stuðtækinu

GRUNNENDURLÍFGUN (BLS) SKREF FYRIR SKREF

Endurlifgunarráð
Icelandic Resuscitation Council **IceRC**

EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL
GUIDELINES
2021

RÖÐ/AÐGERÐIR	LÝSING
EF STUÐ ER EKKI RÁÐLAGT Halda áfram endurlífgun	 <ul style="list-style-type: none">• Ef stuð er ekki ráðlagt, halda strax áfram endurlífgun og fylgja leiðbeiningum frá stuðtæki (AED)
EF EKKERT STUÐTÆKI ER NÁLÆGT Halda áfram endurlífgun	 <ul style="list-style-type: none">• Ef ekkert stuðtæki er nálægt, EÐA beðið er eftir að stuðtæki sé sótt, haldið áfram endurlífgun• Truflið ekki endurlífgun fyrr en:<ul style="list-style-type: none">• Heilbrigðisstarfsmaður segir þér að stöðva endurlífgun EÐA• Einstaklingurinn er auðsjánlega að koma til meðvitundar, hreyfir sig, opnar auga, og andar eðlilega• EÐA• Þú örmagnast• Það er sjaldgæft að hnoð eitt og sér starti hjartanu Haltu áfram hnoði nema þú sért viss um að einstaklingurinn sé að ná sér• Merki um að einstaklingurinn sé að ná sér<ul style="list-style-type: none">• Vaknar upp• Hreyfing• Opnar augu• Andar eðlilega
EF MEÐVITUNDARLAUS EN ANDAR EÐLILEGA Setja í hliðarlegu	 <ul style="list-style-type: none">• Ef þú ert fullviss um að einstaklingurinn andi eðlilega en hann er enn meðvitundarlaus, settu hann í hliðarlegu SJÁ SKYNDIHJÁLPARHLUTA• Vertu viðbúin að hefja endurlífgun án tafar ef einstaklingurinn verður meðvitundarlaus, með óeðlilega eða enga öndun