

HJARTASTOPP TENGTT ÁVERKA EÐA Í KJÖLFAR ÁVERKA

Áverkasjúklingur í hjartastoppi/nær hjartastoppi

Líkur á að hjartastopp sé ótengt áverka

JÁ

ALS

NEI

Hypoxaemia
(Súrefnisskortur)
Hypovolaemia
(of lítið blóðrúmmál)
Tension pneumothorax
(þrýstingsloftbrjóst)
Tamponade
(gollurshússvökvi)

Meðhöndla afturkræfar orsakir jafnóðum:

1. Meðhöndla lífsógnandi útvortis blæðingar
2. Tryggja öndunarveg og gefa háflæði súrefni
3. Stinga á loftbrjóst beggja vegna (thoracostomies)
4. Stinga á gollurshússvökvi (stunguáverkar)
5. Aðgerðir til að stöðva blæðingu (REBOA/þrýstingur á ósæð)
6. Spelka/belti á mjaðmagrind
7. Blóðafurðir/Flæðirit um ofsablæðingu og vökvagjöf

HEFJID
HJARTAHNOÐ

Sérhæfing?
Búnaður?
Umhverfi?
Tímarammi?
frá hjartastoppi
< 15 mín?

Lífsbjargandi
Brjósthol-
aðgerð

**BLÓÐFLÆÐI AFTUR
KOMIÐ Á**

JÁ

NEI

Utan spítala: tafarlaus flutningur á viðeigandi sjúkrahús
Á sjúkrahúsi: Lífsbjargandi inngrip aðgerð/ endurlífgun

Íhuga að hætta endurlífgun